

PRESENTACION DE ENFERMOS, RADIOGRAFIAS E INSTRUMENTOS

Necrosis aséptica de cadera Injerto vascularizado de peroné. Diez años de evolución

Dr. SALOMON GLIKSTEIN*

Paciente A.R., 42 años, sexo masculino, con antecedentes de alcoholismo crónico. El 1/6/81 se comprueba una necrosis aséptica bilateral de cabeza femoral.

El dolor y la impotencia funcional son más acentuados en el lado izquierdo. Radiográficamente tiene un grado III en el izquierdo y grado II en el derecho.

El 1/7/81 se opera siguiendo la técnica de Judet y Gilbert, utilizando un peroné vascularizado.

Se muestran los tiempos quirúrgicos respectivos.

Al año de evolución se advierten signos radiológicos de revascularización cefálica.

A diez años de observación la cadera izquierda es indolora, con 110 grados de flexión. En cambio, la cadera derecha llegó a un grado IV con marcado dolor e incapacidad, que motivó en julio de 1990 la colocación de una prótesis total no cementada.

Motiva la presentación la conservación de la integridad cefálica con articulación móvil e indolora a más de diez años de evolución de una necrosis grado III tratada con injerto vascularizado de peroné.

* II Cátedra de Ortopedia y Traumatología, Policlínico Escuela de Granadero Baigorria, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Rosario.